CARGA GANADERA TOTAL



Especie	Factor de Ponderación (F.P.)				
PORCINA	Reposición	Cebo	Recría	Lechones	Cerdas/Verracos
PORCINA IBÉRICA	0.14	0.12	0.10	0.02	0.30
OVINO-CAPRINO	F.P. único				
	0.15				
BOVINA	Hembras < 24 meses	Machos < 24 meses	Hembras >= 24 meses	Machos >= 24 meses	
	0.6	0.6	1	1	
EQUINA	< 6meses	6-12 meses	12-36 meses	Reproductores	No reproductores
	0.3	0.3	0.6	0.9	0.9
CUNÍCOLA	Engorde	Machos reproductores	Hembras reproductoras	Reposición	Otros
	0.004	0.01	0.01	0.01	0.01
AVIAR	F.P. Único	Cebo	Recría	Ponedoras	Reproductores
Codornices	0.0004				
Faisanes	0.001				
Gallinas		0.004	0.004	0.009	0.010
Ocas	0.006				
Palomas	0.001				
Patos		0.004	0.004		0.008
Pavos	0.004				
Perdices	0.001				
Ratites		0.022			0.100

TABLA. Factores de ponderación para cálculo de UGM.

DESCRIPCIÓN
Para cuantificar la carga ganadera por kilómetro cuadrado se utilizan las Unidades de Ganado Mayor (UGM), que permiten agregar animales diferentes dentro de una misma especie y también animales de distintas especies. Para ello se utilizan los factores de ponderación reflejados en la tabla.

DATOS FUENTE
Registro de Explotaciones Ganaderas de Castilla y León (REGA). Datos de mayo de 2014. Dirección General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural.

PROCESADO ESPACIAL
Cálculo de densidad en un radio de búsqueda de 5 kilómetros mediante la función Kernel de suavizado de superficie. La imagen resultante tiene una resolución de 250 metros de pixel.

Mapa elaborado en junio de 2014 por AEMET e ITACyL. Proyectado en ETRS89 UTM-H30.